

ชื่อเรื่อง ไวรัสโรต้าในเด็ก

ไวรัสโรต้าในเด็ก

เมื่อติดเชื้อแล้ว มักจะทำให้ท้องเสียรุนแรง เป็นได้ทุกเพศทุกวัย
แต่มักเกิดในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 2 ปี



อาการ

-  มีไข้
-  อุจจาระมักมี
กลิ่นเหม็นเปรี้ยว
-  อาเจียน
-  ท้องเสีย ถ่ายเหลวปนน้ำ
ประมาณ 3-7 วัน



สัญญาณเตือน ควรรีบพบแพทย์

- ▲ ปากแห้ง
- ▲ ตาโหล
- ▲ ร้องไห้ไม่มีน้ำตา
- ▲ ซึม
- ▲ กระหายน้ำ
- ▲ ปัสสาวะน้อย

การป้องกัน

-  หยอดวัคซีน
ไวรัสโรต้า
(เป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับเด็กอายุ 6-15 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์)
-  ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร
และหลังเข้าห้องน้ำ
-  ทำความสะอาดสิ่งของ
และของเล่นที่เด็กอาจนำเข้าปาก
-  หลีกเลี่ยงการสัมผัส
หรือใกล้ชิดผู้ป่วย

LINE Ramathibodi

RAMA
CHANNEL
truevisions 42

ศ. พญ.สุพร ตริพงษ์ภักฐณา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
<https://med.mahidol.ac.th/infographics>

คำถามที่ 1 แบบเลือกตอบ (อย่างน้อย 1 คำถาม)

คำถาม ไวรัสโรต้าในเด็กมักทำให้เกิดอาการใดเป็นหลัก?

1. ใช้สูงและเจ็บคอ
2. ท้องเสียและอาเจียน
3. ผื่นแดงตามร่างกาย
4. น้ำมูกไหลและไอเรื้อรัง

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : 2. ท้องเสียและอาเจียน

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: แบบเลือกตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 2 แบบเลือกตอบเชิงซ้อน (อย่างน้อย 1 คำถาม)

จากบทความ เรื่องไวรัสโรต้าในเด็ก ข้อความเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็น จงเลือก

ข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น ในแต่ละข้อความ โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในข้อที่เลือก

ข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็น	ข้อเท็จจริง	ความคิดเห็น
ไวรัสโรต้ามักทำให้เกิดอาการท้องร่วงในเด็กเล็ก		
วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้ามีความจำเป็นสำหรับเด็กทุกคน		
เด็กที่ติดไวรัสโรต้าควรได้รับการดูแลโดยแพทย์ทันที		
การติดไวรัสโรต้าเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับผู้ปกครองทุกคน		
การล้างมืออย่างถูกต้องช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสโรต้าได้		

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : ข้อเท็จจริง , ความคิดเห็น , ข้อเท็จจริง , ความคิดเห็น , ข้อเท็จจริง

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: แบบเลือกตอบเชิงซ้อน

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 3 แบบเติมคำตอบแบบปิด (อย่างน้อย 1 คำถาม)

คำถาม อ่านข้อความด้านล่างและใส่ตัวเลขตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน เรื่องไวรัสโรต้าในเด็ก

ข้อความ	ลำดับเหตุการณ์
ผู้ปกครองพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย	
เด็กเล็กเริ่มมีอาการไข้และอาเจียน	
แพทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กและป้องกันการขาดน้ำ	
อาการท้องร่วงรุนแรงตามมา	
เด็กได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า	

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : 2 , 4 , 1 , 3 , 5

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: เติมคำตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 4 แบบเติมคำตอบแบบเปิด (อย่างน้อย 1 คำถาม)

คำถาม การติดเชื้อไวรัสโรต้ามีผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพของเด็ก

คำตอบ

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : เด็กที่ติดเชื้อไวรัสโรต้ามักมีอาการไข้ อาเจียน ท้องร่วงรุนแรง

อาการท้องร่วงรุนแรง: เด็กอาจถ่ายเหลวหลายครั้งต่อวัน ซึ่งทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำ และแร่ธาตุอย่างรวดเร็ว

ภาวะขาดน้ำ: การสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็วอาจนำไปสู่ภาวะขาดน้ำ ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต หากไม่ได้รับการดูแล เด็กอาจมีอาการปากแห้ง ตัวซีด ไม่มีน้ำตาเวลาร้องไห้ ปัสสาวะน้อย หรือหมดสติในกรณีรุนแรง

การขาดสารอาหาร: ในบางกรณี เด็กที่มีอาการท้องร่วงต่อเนื่องอาจมีปัญหาเรื่องการดูดซึมสารอาหาร ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

ภาวะอ่อนเพลีย: การติดเชื้อทำให้ร่างกายเด็กอ่อนแอ สูญเสียพลังงาน และรู้สึกไม่สบายตัว

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: เติมคำตอบตอบเชิงซ้อน

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 5 แบบเติมคำตอบแบบอิสระ (อย่างน้อย 1 คำถาม)

คำถาม อาการสำคัญที่พบในเด็กที่ติดเชื้อไวรัสโรต้าคืออะไร

คำตอบ.....
.....

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : ท้องร่วงรุนแรง: เด็กจะถ่ายเหลวบ่อยครั้ง บางครั้งมีลักษณะเหมือนน้ำ

อาเจียน: มักเกิดขึ้นในช่วงแรกของการติดเชื้อ

มีไข้: เด็กอาจมีไข้ต่ำถึงปานกลางร่วมด้วย

อาการขาดน้ำ: เช่น ปากแห้ง ปัสสาวะน้อย ไม่มีน้ำตาเมื่อร้องไห้ และอ่อนเพลีย.

เบื่ออาหาร: เด็กอาจกินอาหารได้น้อยลงหรือไม่อยากกินอาหาร

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: เติมคำตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน