

ชื่อเรื่อง เคแมนดำ (*Melanosuchus niger*)



เคแมนดำ (*Melanosuchus niger*) เป็นสายพันธุ์เคแมน ขนาดใหญ่ ที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ล่าที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำอเมซอนและเป็นสมาชิกที่ใหญ่ที่สุดในวงศ์จระเข้ (Alligatoridae) สายพันธุ์นี้พบได้ในพื้นที่ชุ่มน้ำ พุ่มหญ้าสะวันนาที่ถูกน้ำท่วมแม่น้ำ และแหล่ง น้ำจืดอื่นๆ ในบริเวณตอนเหนือของอเมริกาใต้ตั้งแต่เอกวาดอร์ ตะวันออก ไปทางตะวันออกถึงโคลัมเบีย ตะวันออกเฉียงใต้ กายอานา เฟรนช์เกียนา และบราซิล ตอนเหนือ และไปทางใต้ผ่านเปรู ตะวันออก โบลิเวีย ตอนเหนือและบราซิลตอนกลาง แม้ว่าเคแมนดำจะสามารถล่าเหยื่อบนบกได้ แต่พวกมันมักจะโจมตีจากน้ำเพื่อโจมตีเหยื่อที่ตกใจ

เคแมนดำตัวโตเต็มวัยส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ โดยมีความยาวระหว่าง 4 ถึง 5 เมตร (13 ถึง 16 ฟุต) และมีน้ำหนักประมาณ 350 กิโลกรัม (770 ปอนด์) อันที่จริงแล้ว เคแมนดำตัวใหญ่เป็นพิเศษบางตัวสามารถเติบโตได้ยาวถึง 6 เมตร (20 ฟุต) สีสันของเคแมนมีตั้งแต่สีน้ำตาลไปจนถึงสีดำ แต่มีแถบสีเทาหรือน้ำตาลที่ขากรรไกรล่างและมีแถบสีอ่อนตั้งแต่สีขาวไปจนถึงสีเหลืองที่หางและลำตัว เคแมนสายพันธุ์นี้มีปากที่ยาวมนและหู ขากรรไกรที่แข็งแรง ขาที่สั้นพร้อมนิ้วเท้าที่มีกรงเล็บเป็นพังผืด และหางที่ยาว สันกระดูกสองสันบนหัวจะค่อยๆ แคบลงจนถึงบริเวณปาก ขากรรไกรมีฟัน 72 ถึง 76 ซี่ เคแมนที่ยังไม่โตจะมีลักษณะคล้ายกับตัวโตเต็มวัย แต่มีปากสั้นกว่าและมีแถบที่เด่นชัดกว่าเคแมนดำเป็นนักล่าชั้นยอดแม้ว่าขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของสายพันธุ์นี้จะทับซ้อนกับนักล่าขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆ ในอเมริกาใต้ เคแมนดูเหมือนจะมีช่องว่างทางนิเวศน์ ของตัวเอง ดังนั้นจึงมีคู่แข่งเพียงไม่กี่ราย โดยปกติแล้ว เคแมนจะอาบแดดบนริมฝั่งแม่น้ำที่ลาดชันในตอนกลางวันและล่าเหยื่อในตอนกลางคืน โดยโจมตีจากน้ำเป็นหลัก เคแมนที่โตเต็มวัยชอบหอยและปลาเช่นปลาดุกและปิ่นย่าง แต่เคแมนยังกินคาปิบาร์ กวางหนู ป่าสุนัข และปลาคาร์พ ด้วย เคแมนยังเป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกด้วย โดยมีรายงานการโจมตีมนุษย์หลายสิบครั้งตั้งแต่ปี 2543 เคแมนที่โตเต็มวัยจะล่าสิ่งของขนาดเล็ก เช่น สัตว์จำพวกกิ้งก่าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อื่นๆ รวมถึงปลาตัวเล็ก แม้ว่า ขนาด ตัวที่น่าเกรงขาม ของเคแมนดำที่โตเต็มวัย จะเพียงพอที่จะขู่ขวัญนักล่าอื่นๆ ได้ แต่เคแมนที่โตเต็มวัยอาจถูกจับได้โดยคนคอนดาและเสืจกักร์

ตลอดศตวรรษที่ 20 จระเข้เคแมนดำถูกล่าอย่างหนักเพื่อนำหนังมาทำ ผลิตภัณฑ์ หนัง สีดำ และในช่วง ทศวรรษปี 1940 และ 1950 จระเข้และจระเข้ที่มีมูลค่าทางการค้าอื่นๆ ก็มีการล่าสัตว์ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก จำนวนจระเข้และจระเข้ที่มีมูลค่าทางการค้าอื่นๆ ลดลงเมื่อสิ้นสุดศตวรรษที่ 20 จำนวนจระเข้เคแมนดำลดลงถึง 99 เปอร์เซ็นต์ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)

ได้จัดให้กระซู่เคแมนดำเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ระหว่างปี 1982 ถึง 1994 ก่อนจะจัดให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ระหว่างปี 1994 ถึง 1996 และจัดให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อีกครั้งในปี 1996 ในปี 2000 ซึ่งเป็นปีที่ มีการประเมิน ประชากรอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายของ IUCN องค์กรได้จัดให้กระซู่เคแมนดำเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่ำ (หมวดหมู่ที่ IUCN ไม่ใช้อีกต่อไป) การประเมินแสดงให้เห็นหลักฐานว่าประชากรของเคแมนดำกำลังเพิ่มขึ้นและแพร่หลายไปทั่ว ซึ่งบ่งชี้ว่าสายพันธุ์นี้ไม่ได้อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกต่อไป แม้ว่าเคแมนจะประสบความสำเร็จ แต่ก็ยังคงมีการล่าอย่างผิดกฎหมายในหลายประเทศ และนักนิเวศวิทยาสังเกตว่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและการติดต่อและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นกับเคแมนแว่น กำลังกลายเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์นี้

ที่มา - John P Rafferty

- The Editors of Encyclopaedia Britannica Article History

คำถามที่ 1 แบบเลือกตอบ

คำถามที่ 1 เคแมนดำ (Melanosuchus niger)

จากบทความข้างต้น เคแมนดำมีความสำคัญในระบบนิเวศอย่างไร โปรดระบุว่า ความสำคัญดังกล่าวนั้นคืออะไร

คำถามที่ 2 : เคแมนดำ (Melanosuchus niger)

จากบทความข้างต้น โปรดนำเสนอวิธีในการอนุรักษ์หรือป้องกันการสูญพันธุ์มา 1 วิธี พร้อมระบุว่าวิธีที่เสนอนั้นช่วยป้องกันการสูญพันธุ์ได้อย่างไร

คำถามที่ 3 : เคแมนดำ (Melanosuchus niger)

หน่วยงานในข้อใดต่อไปนี้ทำที่ไม่ได้ถูกอ้างอิงในบทความ

1. สหภาพนานาชาติ
2. องค์กรยูเอ็น
3. IUCN
4. ถูกทุกข้อ

คำถามที่ 4 เคแมนดำ (Melanosuchus niger)

ในข้อใดต่อไปนี้เป็นปรากฏการณ์ในบทความข้างต้น

1. เคแมนดำล่าเหยื่อตลอดเวลา
2. เคแมนดำถูกล่าไปทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
3. เคแมนดำเป็นนกล่าขนาดใหญ่
4. เคแมนดำเป็นสายพันธุ์จะเข้ขนาดใหญ่

คำถามที่ 5 : เคแมนดำ (Melanosuchus niger)

จากบทความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ กับวลีที่ว่า “เคแมนดำสายพันธุ์นี้ไม่ได้อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีก” โปรดอธิบายให้เหตุผลที่สอดคล้องกับความคิดเห็น

คำถามที่ 6 เคแมนดำ (Melanosuchus niger)

ข้อความใดต่อไปนี้เป็นข้อสรุปได้จากบทความข้างต้น

1. เคแมนดำเป็นนกล่าที่ขนาดใหญ่ในกลุ่มน้ำอเมซอน
2. เคแมนดำเป็นสัตว์ที่อันตรายกับมนุษย์
3. เคแมนดำมีความสำคัญในระบบนิเวศ
4. เคแมนดำเริ่มมีการถูกล่าจากมนุษย์

คำถามที่ 7 : เคแมนดำ (Melanosuchus niger)

จากบทความข้างต้น นักเรียนคิดว่า เคแมนดำเริ่มมีการสูญพันธุ์ มีแนวโน้มอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น โปรดอธิบายเหตุผลให้สอดคล้องกับความคิดเห็น

แบบฟอร์มการสร้างแบบทดสอบประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน